



# **REALIDAD DE LA SALUD DE LAS MUJERES EN EL ECUADOR**

Encuesta Demográfica y de Salud Materna e  
Infantil, ENDEMAIN 2004 y otras fuentes

**Rocío Rosero Garcés**

**2007**

# MORTALIDAD MATERNA

- Promedio nacional **67 mujeres mueren** por cada 100.000 nacidos vivos
- Cifras mayores en área rural, mujeres pobres y con menor acceso a educación
- **77,9% de las muertes maternas** se dieron por causas obstétricas directas

## MORTALIDAD MATERNA

- En el año 2002 (INEC.2002:12), de **149 muertes maternas** registradas:

**3 son niñas** de 10 a 14 años

**27 fueron adolescentes** de 15 a 19 años

- El **20% de muertes maternas** corresponden a **niñas y adolescentes**.

## ADOLESCENTES Y JÓVENES

8% de mujeres de 15 a 24 años ha tenido relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años; esta cifra aumenta al 30% antes de los 18 años y a 46.2% antes de cumplir los 25 años

## ADOLESCENTES Y JÓVENES

- El **desconocimiento** y la **desinformación** de las/os jóvenes sobre los riesgos de una sexualidad temprana y sobre los métodos para la regulación de la fecundidad, producen **embarazos no deseados** y **enfermedades de transmisión sexual**.

## ADOLESCENTES Y JÓVENES

La edad de la primera relación sexual decrece a medida que aumentan los años de educación; igualmente es importante destacar el cuanto más bajo es el nivel económico, las mujeres inician relaciones sexuales a más temprana edad

## EMBARAZO EN ADOLESCENTES

- El embarazo en mujeres menores de 18 años constituye por la edad una causa de alto riesgo obstétrico y de muerte materna.
- En 1994, 7.9% de adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron un embarazo; en 1998 se eleva al 9.8%; en el 2003 8.7%.
- En el 2003 las adolescentes entre 12 y 19 años constituyen el 16,0% de las mujeres embarazadas del país.

SIISE, y Mujeres y Hombres en Cifras

## EMBARAZO EN ADOLESCENTES

- Entre las mujeres de 15 a 24 años (en niños nacidos vivos), 87.5% quería tener hijos/as al momento de quedar embarazada, 80% no quería quedarse embarazada todavía y 88.4% definitivamente no quería tener hijos/as



# EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Edad al primer embarazo	En niños nacidos vivos	Pérdida	Nacidos muertos	Aún embarazadas	No. Casos
Menos de 15	88.9%	9.4%	0.0%	1.7%	126
15 a 17 años	88.6%	4.6%	1.3%	5.5%	742
18 a 19 años	87.7%	4.8%	0.7%	6.9%	478
20 a 24 años	74.7	8.6%	0.0%	16.7	332


## EMBARAZO ADOLESCENTE

Problema mayor en las áreas rurales y más frecuentes en las adolescentes de menor instrucción: 32.3% de las adolescentes sin ningún nivel de instrucción y un 16.7% con instrucción primaria incompleta ya eran madres.

# EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Fuente: Hospital Enrique Sotomayor  
Guayaquil


<b>Año</b>	<b>Partos de adolescentes (- 15 a 19 años)</b>	<b>Total de partos</b>
2005	12758	33135
Enero a junio 2006	5129	16880



# PARTOS DE ADOLESCENTES EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS

Fuente: Hospital Enrique Sotomayor

<b>Año</b>	<b>Número de partos</b>
2003	10.012
2004	12.147
2005	12.758



# ANTICONCEPTIVOS

- 96% de mujeres de 15 a 49 años conocen o han oído hablar de algún método anticonceptivo.
- Los más conocidos son las pastillas, la esterilización femenina, los condones, el DIU y la inyección.

# ANTICONCEPTIVOS

- 73 de cada 100 mujeres ecuatorianas en unión de 15 a 49 años usan algún método anticonceptivo (72.7%)
- Incremento en el uso de métodos anticonceptivos es del orden del 116% (en relación a 1979)
- 58.7% usan métodos modernos y un 14% a métodos tradicionales de menor eficacia (ritmo, retiro y MELA).

# ANTICONCEPTIVOS

- En el área urbana 76.6% usan métodos anticonceptivos; en el área rural 67.1%.
- Bajo uso de anticonceptivos en Azuay (59.3%) y Cañar (52.4%).
- Uso de métodos tradicionales es mayor al 20% en Carchi, Imbabura, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Loja.

## ANTICONCEPTIVOS

- A mayor educación mayor uso: 79.9% en mujeres que tienen educación superior o postgrado, 51% de mujeres sin educación formal.
- A mayor nivel económico mayor uso: 77.8% de mujeres de hogares altos los usan mientras que las del nivel bajo llegan a un 64.9%.



# VIOLENCIA

- 7 % de las mujeres de 15 a 49 años de edad reportó que en el transcurso de su vida fue violada (con penetración).
- 4 % mencionó alguna situación de abuso sexual (violación sin penetración).
- El 80% de las denuncias recibidas por las Juntas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes corresponden a violencia infantil en el ámbito educativo (Lazo: 2005. s/ref.).

## VIOLENCIA

- 121 de cada 1000 jóvenes han sufrido besos y caricias no deseadas
- 32 de cada 1000 jóvenes han sido violados
- 27 de cada 1000 han vivido experiencias de violencia sexual oral y genital. (CEPAM Quito. 2003: 46).

# ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Fuente: Dirección Provincial de Salud del Guayas

Enfermedad	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	casos	casos	casos	casos	casos	casos	casos	casos
Sífilis congénita	32	55	39	35	19	36	23	21
Sífilis primaria - secundaria	426	741	579	1008	757	830	674	710
Gonorrea	1,624	1886	1757	1915	1060	1113	1089	1369
Herpes genital	678	1059	1012	867	680	637	714	783
Sida	158	259	258	219	249	227	305	828

Enfermedades de transmisión sexual

